

Badania przeprowadzane w Przychodniach Przeciwgruźliczych

Prześwietlenie klatki piersiowej

Badanie to przeprowadza się w celu sprawdzenia, czy cierpicie Państwo na gruźlicę płuc. Może ono zostać później powtórzone, aby przekonać się o skuteczności leczenia.

Badanie plwociny/ flegmy

Możecie Państwo zostać poproszeni o zapewnienie próbek plwociny, aby sprawdzić, czy cierpicie na gruźlicę płuc. Badanie to może zostać później powtórzone, aby przekonać się o skuteczności leczenia.

Badania krwi

Badania krwi mogą wykazać, czy macie Państwo anemię lub ulegliście infekcji. Powtórzenie tych badań po rozpoczęciu leczenia umożliwia nam określenie, czy infekcja mija.

Inne badania są przeprowadzane w celu kontroli pracy wątroby i nerek przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia. Badania te są ważne, gdyż niektóre z przyjmowanych leków mogą wpłynąć na funkcjonowanie wątroby i nerek.

Badania innych infekcji

Wszystkim osobom, które przychodzą do Przychodni Przeciwgruźliczej oferujemy badanie na obecność wirusa HIV. Wirus HIV niszczy system obronny organizmu, a w związku z tym łatwiej można zachorować na gruźlicę. Istnieje dobry sposób leczenia osób zakażonych wirusem HIV, który może polepszyć stan zdrowia.

Badania innych infekcji

Możemy również przebadać, czy nie nastąpiło zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B i C. Infekcje te mogą zmienić sposób pracy wątroby i wpłynąć na leczenie przeciwgruźlicze. Jeśli wynik badania będzie pozytywny, możecie Państwo zostać skierowani do specjalistycznego zespołu.

Poufność

Wyniki wszystkich badań będą traktowane jako poufne, a informacje zostaną przekazane wyłącznie przedstawicielom służby zdrowia, którzy biorą bezpośredni udział w opiece nad Państwem.

Dalsze informacje

Wirus HIV

NAHIP: www.nahip.org.uk

Do It Right:

www.doitright.uk.com

THT: www.tht.org.uk

Gruźlica

NKS TB:

www.hpa.org.uk/tbknowledge

TB Alert: www.tbalert.org

Inne przydatne strony internetowe

NHS choices: www.nhs.uk

Health Protection Agency:

www.hpa.org.uk